NCTF® | 135 / 135 HA

Laboratoires FILL-MED
2-4 rue de Lussonne - 75008 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 42 99 94 00 - www.fillmed.com

FR NCTF® 135 / 135 HA

EN NCTF® 135 / 135 HA

ES NCTF® 135 / 135 HA

DE NCTF® 135 / 135 HA

IT NCTF® 135 / 135 HA

NL NCTF® 135 / 135 HA

PT NCTF® 135 / 135 HA

NCTF® 135
Acide hyaluronique
+ solution polynotifiante

NCTF® 135HA
Acide hyaluronique hautement concentré
+ solution polynotifiante

NOTICE D'UTILISATION

DESCRIPTION
5 flacons de 3 ml
5 seringues de 3ml
5 aiguilles de prélèvement 18G
5 aiguilles de traitement 30G
5 aiguilles de traitement 32G

COMPOSITION

Acide hyaluronique	**Conc. (mg/ml)**
Sel de sodium de sodium non reticulé	0,025
NCTF® 135HA	
Hyaluronate de sodium non réticulé	5,00

Solution polynotifiante
12 Vitamines
Acide L-ascorbique (Vit. C)
Biotine (Vit. B8)
Pantothénate de calcium (Vit. B5)
Acide Folique (Vit. B9)
Inositol (Vit. I)
Nicotinamide (Vit. B3)
Pyridoxine (Vit. B6)
Riboflavine (Vit. B2)
Thiamine (Vit. B1)
Tocophérol (Vit. E)
Rétinol (Vit. A)
Vitamine B12
6 Minéraux
Chlorure de Calcium
Chlorure de Potassium
Sulfate de Magnesium
Acétate de Sodium
Chlorure de Sodium
Dihydrogénophosphate de sodium
5 Acides nucléiques
Désoxyadénosine
Désoxycytidine
Désoxyguanosine
Désoxythymidine
5-Methyl-2'-désoxycytidine
24 Acides aminés
α-Aminobutyric acid
Alanine
Arginine
Asparagine
Aspartic acid
Cystine
Glutamine
Glutamic acid
Glycine
Histidine
Hydroxyproline
Isoleucine
Leucine
Lysine
Methionine
Ornithine
Phenylalanine
Proline
Serine
Taurine
Threonine
Tryptophane
Tyrosine
Valine
6 Coenzymes
TPP (cocarboxylase)
CoA (Coenzyme A)
FAD (Flavine adénine dinucléotide)
NAD (Nicotinamide adénine dinucléotide)
NADP (Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate)
UTP (Uridine triphosphate)
Autres
Glutathione
Polyuridylate (H)
Acide glucuronique
Gluconolactone lactone
Glucosamine
Dextrose anhydre

INDICATIONS
NCTF® 135 : Produit de mésothérapie anti-âge ayant pour indication la Biorevitalisation, l'hydratation et tiraillement des peaux fatiguées ou ternes et la prévention du vieillissement cutané et des rides.
NCTF® 135HA : Produit de mésothérapie anti-âge ayant pour indication la Bio-revitalisation et l'hydratation intense des peaux fatiguées ou en manque d'éclat, le traitement des rides et la redensification des peaux matures ou marquées de tension.
NCTF® 135 et NCTF® 135HA sont indiqués pour être injectés dans l'épiderme ou dernier sur les zones suivantes:
• Visage (excepté la zone périorbitale)
• Yeux
• Décolleté
• Dos des mains
• Face interne des bras

CONTRE INDICATIONS
Ne pas injecter dans les vaisseaux sanguins.
Ne doit pas être utilisé chez :
• des patients présentant une maladie ou une altération cutanée au niveau des points d'injection.
• des patients présentant des antécédents de maladies autoimmunes ou sous immunothérapie.
• des patients présentant une hypersensibilité ou une allergie connue à l'un des composants.
• la femme enceinte ou allaitante.
• les enfants.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
Il n'y a pas de données cliniques disponibles en termes de tolérance quand à l'injection de NCTF® 135 et NCTF® 135HA dans une zone ayant déjà été traitée avec un autre produit de comblement. Il est recommandé d'attendre 4 à 6 semaines après la période visé, bien que NCTF® 135 et NCTF® 135HA ne soient pas injectés dans la même plan.
Les patients recevant un traitement anticoagulant ou un inhibiteur de l'agrégation plaquettaire (par exemple, de l'aspirine) doivent être informés du risque accru d'ecchymoses et de légers saignements au point d'injection.
Recommander au patient de ne pas se maquiller pendant les 12 heures qui suivent l'injection et d'éviter l'exposition prolongée au soleil, aux UV, au gel, ainsi que la pratique du sauna ou du hammam pendant les 48 heures qui suivent l'injection.
Se référer aux techniques de mésothérapie est conseillée pour l'utilisation de NCTF® 135 et NCTF® 135HA.
NCTF® 135 et NCTF® 135HA ne doivent pas être injectés intentionnellement à un endroit déjà enflammé ou infecté (ex: dermabrasion).
Un anesthésique local (patch ou crème) peut être appliqué préalablement à l'injection. Veuillez vous référer aux produits anesthésiants pouvant entraîner localement une réaction ou une hypersensibilité.
Ne pas injecter NCTF® 135 et NCTF® 135HA dans des grains de beauté trainé et dans des lésions cutanées type acné sévère.

INCOMPATIBILITÉS
Il existe une incompatibilité connue entre l'acide hyaluronique et les sels d'ammonium quaternaire tels que le chlorure de benzalkonium.
Il convientra donc de ne jamais mettre NCTF® 135 et NCTF® 135HA en contact avec des solutions contenant du matériel médico-chirurgical traité avec ce type de produit.

EFFETS INDÉSIRABLES
Le praticien doit informer le patient qu'il existe des effets secondaires potentiels liés à l'implantation de ce dispositif tels que:
Réagissez vu inflammation locale légère qui disparaissent après 24 à 48 heures.
Œdèmes légers et hématomes de petites tailles peuvent survenir au point d'injection et disparaissent rapidement.
Saignement minime au niveau du site d'injection qui cesse spontanément et rapidement après l'injection.
Douleur transitoire au niveau du site d'injection.
La persistance de réactions inflammatoires au-delà d'une semaine ou l'apparition de tout autre effet secondaire, doit être signalés au praticien par le patient dans les meilleurs délais. Le praticien doit alors prendre les mesures appropriées.
Tout autre effet secondaire indésirable lié à l'injection de NCTF® 135 et NCTF® 135HA doit être signalé au distributeur et/ou au fabricant.

MODE D'EMPLOI
Avant de commencer le traitement, le patient doit être informé des indications du dispositif, de ses contre-indications, de ses incompatibilités et de ses effets indésirables potentiels.
Toutes les précautions d'hygiène et d'asepsie doivent être prises lors de l'injection de NCTF® 135 et le patient devra être protégé.
1) Préparer une seringue de 1ml à 3ml avec une aiguille de 18G et préparer de façon stérile la solution de NCTF® 135 ou NCTF® 135HA pour l'injection.
2) Déconnecter l'aiguille 18G et connecter l'aiguille stérile adéquate pour injection fournie dans le kit 30G ou 32G à la seringue remplie de NCTF® 135 ou NCTF® 135HA.
3) Retirer la capuche de l'aiguille et injecter NCTF® 135 ou NCTF® 135HA.

NCTF® 135 et NCTF® 135HA peuvent être également utilisés avec des dispositifs de mésothérapie de type pistolet ou roller.
Les données relatives à l'injection (coordonnées des patients et numéro de lot du produit) doivent être consignées par le praticien.

PROTOCOLE
Protocole standard de 5 traitements, les 3 premiers à 2 semaines d'intervalle, les 2 derniers à 1 mois d'intervalle, une fois par an. Des traitements supplémentaires peuvent être réalisés tous les 3 ou 6 mois si le praticien le juge nécessaire au regard de la qualité de la peau.

MISES EN GARDE
• Vérifier la date de péremption sur l'étiquetage.
• Ne pas réutiliser.
• Ne pas restériliser.
• Après utilisation, les aiguilles doivent être jetées dans un contenant sécuritaire approprié.
• Une réutilisation du produit reside des risques liyer au, de contamination croisiod pour le patient.
• Ne pas utiliser si le conditionnement est ouvert ou endommagé.

CONDITIONS DE STOCKAGE / CONSERVATION
A conserver NCTF® 135 et NCTF® 135HA entre 2 et 25 °C (36-77 °F) dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité. Manipuler avec précaution.

NCTF® 135
Hyaluronic acid
- polynotifying solution

NCTF® 135HA
Highly concentrated hyaluronic acid
+ polynotifying solution

INSTRUCTIONS FOR USE

DESCRIPTION
5 x 3ml vials
5 x 3ml syringes
5 x 18G withdrawal needles
5 x 30G treatment needles
5 x 32G treatment needles

COMPOSITION

Hyaluronic acid	**Conc. (mg/ml)**
NCTF® 135	
Non-crosslinked Sodium Hyaluronate	0,025
NCTF® 135HA	
Non-crosslinked Sodium Hyaluronate	5,00

Polynotifying solution
12 Vitamins
Ascorbic acid (Vit. C)
Biotin (Vit. B8)
Pantothenic acid (vit. B5)
Folic acid (vit. B9)
Inositol (vit. I)
Nicotinamide (vit. B3)
Pyridoxine (vit. B6)
Riboflavin (vit. B2)
Thiamine (vit. B1)
Tocopherol (vit. E)
Retinol (vit. A)
Vitamin B12
6 Minerals
Calcium chloride
Potassium chloride
Magnesium sulfate
Sodium acetate
Sodium chloride
Sodium dihydrogenophosphate
5 Nucleic Acids
Deoxyadenosine
Deoxycytidine
Deoxyguanosine
Deoxythymidine
5-Methyl-2'-deoxycytidine
24 Amino Acids
α-Aminobutyric acid
Alanine
Arginine
Asparagine
Aspartic acid
Cystine
Glutamine
Glutamic acid
Glycine
Histidine
Hydroxyproline
Isoleucine
Leucine
Lysine
Methionine
Ornithine
Phenylalanine
Proline
Serine
Taurine
Threonine
Tryptophan
Tyrosine
Valine
6 coenzymes
TPP (cocarboxylase)
CoA (Coenzyme A)
FAD (Flavine adénine dinucléotide)
NAD (Nicotinamide adénine dinucléotide)
NADP (Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate)
UTP (Uridine triphosphate)
Others
Glutathione
Polyuridylate (H)
Gluconic acid
Gluconic acid lactone
Glucosamine
Dextrose anhydrous

INDICATIONS
NCTF® 135 : Anti-ageing mesotherapy product indicated for revitalization, hydration of tired or dull skin and treatment of wrinkles and fine lines.
NCTF® 135HA : Anti-ageing mesotherapy product indicated for intense revitalization and hydration of tired or dull skin, treatment of wrinkles and redensification of mature or slack skin.
NCTF® 135 and NCTF® 135HA are indicated to be injected in the epidermis or dermis on the following areas:
• Face (excluding the periorbital area)
• Neck
• Décolleté area
• Back of the hands
• Internal face of the arms

CONTRAINDICATIONS
Do not inject into blood vessels.
Do not use in:
• patients with a skin alteration or disease at any kind in the treated area.
• patients with a history of auto-immune disease or under immunotherapy.
• patients with hypersensitivity or a known allergy to any of the constituents.
• pregnant or breast-feeding women.
• children.

PRECAUTIONS FOR USE
There are no clinical data available in terms of tolerance with regard to the injection of NCTF® 135 and NCTF® 135HA in an area that has already been treated with another "permanent" filling product. Precaution should be taken in such cases, although NCTF® 135 and NCTF® 135HA should not be injected in the same plan.
Patients receiving an anticoagulant treatment or a platelet aggregation inhibitor (for example, aspirin) must be informed of the increased risk of bruising and mild bleeding at the injection site.
The patient should be given the recommendation not to use makeup for 12 hours following the injection and to avoid prolonged exposure to the sun, UV rays, freezing temperatures as well as to avoid the practice of steam rooms for at least 48 hours after the injection.
Strict mesotherapy technique is recommended for the use of NCTF® 135 and NCTF® 135HA.
NCTF® 135 and NCTF® 135HA must not be injected at the same time in an area with inflammation (eg: dermabrasion).
A local anaesthetic (patch or cream) can be applied prior to the injection. Please refer to the drug chaarateristic products can cause local redness or hypersensitivity.
Do not inject NCTF® 135 and NCTF® 135HA into beauty spots (naevi) and severe acne lesions.

INCOMPATIBILITIES
There is a known incompatibility between hyaluronic acid and salts of quaternary ammonium, such as benzalkonium chloride.
NCTF® 135 and NCTF® 135HA should therefore never come into contact with solutions containing any medical/surgical equipment which has been treated with this type of product.

UNDESIRABLE EFFECTS
The practitioner must inform the patient that there are possible undesirable effects related to the implantation of this device, such as:
Redness or mild local inflammation that usually disappears within 24 to 48 hours.
Mild oedema and small haematomas may occur, but disappear rapidly after injection.
Minimal bleeding at the injection site that stops rapidly and spontaneously after the injection.
Transient pain at the injection site.
The patient must notify the practitioner as soon as possible of any inflammatory reactions lasting more than one week or the appearance of any other adverse effect. The practitioner must then take the appropriate measures.
Any other adverse effect related to the injection of NCTF® 135 and NCTF® 135HA must be reported to the distributor and/or manufacturer.

INSTRUCTIONS FOR USE
Before starting treatment, the patient must be informed of the indications of the device, its contraindications, its incompatibilities and its possible undesirable effects.
All asepsis and hygiene precautions must be taken to prepare the site for injection and the patient must be protected.
1) Connect a 18G needle to a 3 ml syringe (provided in the kit) and prepare the solution of NCTF® 135 or NCTF® 135HA solution for injection.
2) Disconnect the 18G needle and connect the suitable sterile 30G needle for injection provided in the kit (30G or 32G) to the syringe filled with NCTF® 135 or NCTF® 135HA.
3) Remove the cap of the needle and inject the NCTF® 135 or NCTF® 135HA.

NCTF® 135 and NCTF® 135HA can also be used with mesotherapy devices like gun or roller.
Data relating to the injection (patient details and product batch number) must be kept by the practitioner.

PROTOCOL
Standard protocol of 5 treatments, the first 3 at intervals of 2 weeks and the last 2 at an interval of 1 month, once per year. Additional treatments can be given every 3 or 6 months if the practitioner deems it necessary with regard to skin quality.

WARNINGS
• Check the expiry date on the label.
• Do not reuse.
• Do not resterilize.
• After use, the needles must be thrown away in a suitable safe container.
• Reuse of the product involves risks (e.g. cross contamination) for the patient.
• Do not use if the packaging is open or damaged

STORAGE / CONSERVATION CONDITIONS
Store NCTF® 135 and NCTF® 135 HA between 2 and 25°C (36-77°F) in a dry place protected from light and moisture. Handle with caution.

NCTF® 135
Ácido hialurónico
+ solución polinotificante

NCTF® 135HA
Ácido hialurónico muy concentrado
+ solución polinotificante

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN
5 ampollas de 3ml
5 jeringas de 3ml
5 agujas de extracción de calibre 18G
5 agujas de tratamiento de calibre 30G
5 agujas de tratamiento de calibre 32G

COMPOSICIÓN

Ácido hialurónico	**Conc. (mg/ml)**
NCTF® 135	
Hialuronato sódico no reticulado	0,025
NCTF® 135HA	
Hialuronato sódico no reticulado	5,00

Solución polinotificante
12 vitaminas
Ácido L-ascórbico (vit. C)
Biotina (vit. B8)
Pantotenato de Ca (vit. B5)
Ácido fólico (vit. B9)
Inositol (vit. I)
Nicotinamida (vit. B3)
Piridoxina (vit. B6)
Riboflavina (vit. B2)
Tiamina (vit. B1)
Tocoferol (vit. E)
Retinol (vit. A)
Vitamina B12
6 minerales
Cloruro cálcico
Cloruro potásico
Sulfato magnésico
Acetato sódico
Cloruro sódico
Dihidrogenofosfato sódico
5 ácidos nucleicos
Desoxiadenosina
Desoxicitidina
Desoxiguanosina
Desoxitimidina
5-metil-2'-desoxicitidina
24 aminoácidos
Ácido α-aminobutírico
Alanina
Arginina
Asparagina
Ácido aspártico
Cistina
Glutamina
Ácido glutámico
Glicina
Histidina
Hidroxiprolina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Ornitina
Fenilalanina
Prolina
Serina
Taurina
Treonina
Triptófano
Tyrosina
Valina
4 coenzimas
TPP (Cocarboxilasa)
CoA (Coenzima A)
FAD (Flavina adenina dinucleótido)
NAD (Nicotinamida adenina dinucleótido)
NADP (Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato)
UTP (Uridina trifosfato)
Otros
Glutatión
Poliuridilato 80
Ácido glucurónico
Gluconolactona
Glucosamina
Dextrosa anhidra

INDICACIONES
NCTF® 135: Producto para mesoterapia antienvejecimiento indicado para la revitalización y la hidratación de la piel cansada o mate y el tratamiento de las arrugas superficiales.
NCTF® 135HA: Producto para mesoterapia antienvejecimiento indicado para la revitalización y la hidratación intensas de la piel cansada o mate, el tratamiento de las arrugas y la redensificación de la piel madura o flácida.
NCTF® 135 y NCTF® 135HA están indicados para ser inyectados en la epidermis o en la dermis en los siguientes áreas:
• Cara (excluyendo el área periorbitalaria)
• Cuello
• Área del escote
• Dorso de las manos
• Cara interna de los brazos

CONTRAINDICACIONES
No inyectar dentro de vasos sanguíneos.
No utilizar en:
• pacientes con una alteración o enfermedad cutánea de cualquier tipo en el área tratada.
• pacientes con antecedentes de enfermedad autoinmunitaria o tratados con inmunoterapia.
• pacientes con hipersensibilidad o alergia conocida a cualquiera de los componentes.
• mujeres embarazadas o que estén dando de mamar.
• niños.

PRECAUCIONES DE USO
No se dispone de datos clínicos sobre la tolerancia a las inyecciones de NCTF® 135 o NCTF® 135HA en una zona que ya ha sido tratada con otro producto de relleno permanente. En estos casos debe tenerse precaución, aunque NCTF® 135 y NCTF® 135HA no se hayan de inyectar en el mismo plano.
Se debe informar a los pacientes que reciban tratamiento anticoagulante o un inhibidor de la agregación plaquetaria (por ejemplo, ácido acetilsalicílico) del mayor riesgo de hematomas y de hemorragia leve en el punto de la inyección.
Se debe recomendar al paciente que no se maquille en las 12 horas siguientes a la inyección y que evite la exposición prolongada al sol, los rayos UV y las temperaturas muy frías, así como el uso de saunas o baños de vapor durante al menos 48 horas después de la inyección.
Se recomienda la formación en técnicas de mesoterapia para el uso de NCTF® 135 y NCTF® 135HA.
No se debe inyectar NCTF® 135 y NCTF® 135HA al mismo tiempo en una zona con inflamación (p. ej., dermoabrasión).
Se puede aplicar un anestésico local (parche o crema) tan solo antes de la inyección. Debe tenerse en cuenta que los anestésicos pueden provocar una reacción local o hipersensibilidad.
No se deben inyectar NCTF® 135 y NCTF® 135HA en lunares (nevos) ni en lesiones cutáneas de tipo acné grave.

INCOMPATIBILIDADES
Existe una incompatibilidad conocida entre el ácido hialurónico y las sales de amonio cuaternario, como el cloruro de benzalconio.
Por lo tanto, NCTF® 135 y NCTF® 135HA nunca deben entrar en contacto con todos productos o con equipo médico o quirúrgico tratado con este tipo de productos.

EFECTOS INDESEABLES
El profesional debe informar al paciente de que pueden producirse efectos indeseables relacionados con la implantación de este dispositivo, como:
Enrojecimiento o inflamación local leve, que habitualmente desaparece en 24 a 48 horas.
Pueden producirse edemas leves y hematomas pequeños, pero desaparecen con rapidez.
Hemorragia leve en el punto de la inyección, que se detiene rápida y espontáneamente después de la inyección.
Dolor transitorio en el punto de la inyección.
El paciente debe informar inmediatamente de todas las antes posible de cualquier reacción inflamatoria que dure más de una semana, o de la aparición de cualquier otro efecto adverso. El profesional debe tomar las medidas adecuadas en tratamiento adecuado.
Se deben notificar al distribuidor y/o al fabricante todos los demás efectos adversos relacionados con la inyección de NCTF® 135 y NCTF® 135HA.

PROTOCOLO
Protocolo estándar de 5 tratamientos, los 3 primeros a intervalos de 2 semanas y los 2 últimos separados entre sí 1 mes, una vez al año. Se pueden administrar tratamientos adicionales cada 3 o 6 meses si el profesional lo considera necesario, en relación con la calidad de la piel.

ADVERTENCIAS
• Verificar la fecha de caducidad de la etiqueta.
• No reutilizar.
• No resterilizar.
• Después de su uso, se deben desechar las agujas en un contenedor seguro adecuado.
• La reutilización del producto supone riesgos (p. ej., contaminación cruzada) para el paciente.
• No utilizar si el envase está abierto o dañado.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO / CONSERVACIÓN
Almacenar NCTF® 135 y NCTF® 135HA entre 2 y 25 °C (36-77 °F) en un lugar seco protegido de la luz y la humedad. Manejar con precaución.

NCTF® 135
Hyaluronsäure
+ polynotifizierende Lösung

NCTF® 135HA
Hochkonzentrierte Hyaluronsäure
+ polynotifizierende Lösung

GEBRAUCHSANWEISUNG

BESCHREIBUNG
5 x 3ml Ampullen
5 x 3ml Spritzen
5 x 18G Entnahmenadeln
5 x 30G Behandlungsnadeln
5 x 32G Behandlungsnadeln

ZUSAMMENSETZUNG

Hyaluronsäure	**Menge (mg/ml)**
NCTF® 135	
Unvernetztes Natriumhyaluronat	0,025
NCTF® 135HA	
Unvernetztes Natriumhyaluronat	5,00

Polyvitalisierende Lösung
12 Vitamine
L-Ascorbinsäure (Vit. C)
Biotin (Vit. B8)
Pantothensäure (Vit. B5)
Folsäure (Vit. B9)
Inositol (Vit. I)
Nicotinamid (Vit. B3)
Pyridoxin (Vit. B6)
Riboflavin (Vit. B2)
Thiamin (Vit. B1)
Tocopherol (Vit. E)
Retinol (Vit. A)
Vitamin B12
6 Mineralien
Calciumchlorid
Kaliumchlorid
Magnesiumsulfat
Natriumacetat
Natriumchlorid
Natriumdihydrogenphosphat
5 Nukleinsäuren
Desoxyadenosin
Desoxycytidin
Desoxyguanosin
Desoxythymidin
5-Methyl-2'-Desoxycytidin
24 Aminosäuren
α-Aminobuttersäure
Alanin
Arginin
Asparagin
Asparaginsäure
Cystin
Glutamin
Glutaminsäure
Glycin
Histidin
Hydroxyprolin
Isoleucin
Leucin
Lysin
Methionin
Ornithin
Phenylalanin
Prolin
Serin
Taurin
Threonin
Tryptophan
Tyrosin
Valin
4 Coenzyme
TPP (Cocarboxylase)
CoA (Coenzym A)
FAD (Flavinadenindinucleotid)
NAD (Nicotinamidadenin-Dinucleotid)
NADP (Nicotinamidadenin-Dinucleotidphosphat)
UTP (Uridintriphosphat)
Sonstiges
Glutathion
Polyuridylat 80
Gluconsäure
Gluconsäurelacton
Glucosamin
Wasserfreie Dextrose

ANWENDUNGSGEBIETE
NCTF® 135: Anti-Aging-Mesotherapieprodukt für die Revitalisierung und Feuchtigkeitsversorgung der matten oder müden Haut, zur Behandlung von feinen Fältchen.
NCTF® 135HA: Anti-Aging-Mesotherapieprodukt für die intensive Revitalisierung und Feuchtigkeitsversorgung der matten oder müden Haut, Faltenbehandlung und Verdichtung der reifen oder schlaffen Haut.
NCTF® 135 und NCTF® 135HA sind für die Injektion in die Epidermis oder Dermis in den folgenden Bereichen bestimmt:
• Gesicht (ausgenommen des Periorbitalbereichs)
• Hals
• Dekolletébereich
• Handrücken
• Innenseite der Arme

GEGENANZEIGEN
Nicht in Blutgefäße injizieren.
Darf nicht angewendet werden bei:
• Patienten mit einer Hautveränderung oder Erkrankung jeglicher Art im Behandlungsbereich.
• Patienten mit autoimmunbedingt belegter Autoimmunerkrankung oder unter Immuntherapie.
• Patienten mit einer Überempfindlichkeit oder einer bekannten Allergie gegenüber einem der Bestandteile.
• schwangeren oder stillenden Frauen.
• Kindern.

PRECAUCIONES DE USO
Es liegen keine klinischen Daten im Hinblick auf die Verträglichkeit von Injektion von NCTF® 135 und NCTF® 135HA in einen Bereich vor, der bereits mit einem anderen „permanenten" Auffüllprodukt behandelt wurde. Daher sollte mit Vorsicht vorgegangen werden, obwohl NCTF® 135 und NCTF® 135HA nicht auf gleicher Ebene injiziert werden.
Patienten, die eine gerinnungshemmende Therapie oder einen Thrombozytenaggregationshemmer (zum Beispiel Aspirin) nehmen, sind darauf hinzuweisen, dass sie ein erhöhtes Risiko von Blutergüssen und leichten Blutungen an der Injektionsstelle aufgrund der Injektion.
Der Patient sollte darauf hingewiesen werden, dass er 12 Stunden nach der Injektion kein Make-up zu verwenden und eine längere Sonnenexposition, UV-Strahlen, Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sowie Aufenthalte in der Sauna oder im Schwitzraum für mindestens 48 Stunden nach jeder Injektion zu vermeiden.
Es wird empfohlen, die Mesotherapie-Technik bei der Verwendung von NCTF® 135 und NCTF® 135HA anzuwenden.
Injizieren Sie NCTF® 135 und NCTF® 135HA nicht gleichzeitig mit einem Medium oder einem chemischen Teilbereich oder einer Dermabrasion angewendet werden.
Ein Lokalanästhetikum (Pflaster oder Creme) kann vor der Injektion angewendet werden. Bitte beachten Sie, dass Anästhetika eine lokale Reaktion oder Überempfindlichkeitsreaktionen hervorrufen können.
NCTF® 135 oder NCTF® 135HA nicht in Muttermale (Nävi) und schwere Akne-Läsionen injizieren.

UNVERTRÄGLICHKEITEN
Es besteht eine bekannte Unverträglichkeit zwischen Hyaluronsäure und quartären Ammoniumsalzen wie Benzalkoniumchlorid.
NCTF® 135 und NCTF® 135HA dürfen daher niemals in Kontakt mit diesen Produkten oder mit medizinischen/chirurgischen Geräten kommen, die mit diesem Produkt behandelt wurden.

UNERWÜNSCHTE EFFEKTE
Der Anwender muss den Patienten über die möglichen Nebenwirkungen in Verbindung mit der Implantation dieses Produkts informieren, wie zum Beispiel:
Rötungen oder leichte Entzündungen, die normalerweise innerhalb von 24 bis 48 Stunden verschwinden.
Leichtes Ödem und kleine Hämatome, diese klingen aber innerhalb von 48 Stunden ab.
Minimale Blutung an der Injektionsstelle, die nach der Injektion von selbst und schnell aufhört.
Vorübergehende Schmerzen an der Injektionsstelle.
Der Patient muss den Anwender so schnell wie möglich über alle entzündlichen Reaktionen, die mehr als eine Woche anhalten, sowie über das Auftreten von Nebenwirkungen informieren. Der Anwender muss die Nebenwirkung mit einer geeigneten Behandlung behandeln.
Jede andere Nebenwirkung in Verbindung mit der Injektion von NCTF® 135 und NCTF® 135HA müssen dem Händler und/oder Hersteller gemeldet werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Vor Beginn der Behandlung muss der Patient über die Anwendungsgebiete des Produkts, seine Gegenanzeigen, Unverträglichkeiten und die möglichen Nebenwirkungen aufgeklärt werden.
Alle Asepsis- und Hygienevorkehrungen müssen zur Vorbereitung des Behandlungsbereichs, des Materials und des Patienten vor der Injektion getroffen werden.
1) Eine 18G Nadel auf eine 3 ml-Spritze aufsetzen (im Set enthalten) und die zu injizierende NCTF® 135- oder NCTF® 135HA-Lösung aseptisch herausziehen.
2) Die 18G-Nadel abnehmen und die geeignete sterile Injektionsnadel aus dem Set (30G oder 32G) auf die mit NCTF® 135 oder NCTF® 135HA gefüllte Spritze setzen.
3) Die Schutzkappe der Nadel entfernen und NCTF® 135 oder NCTF® 135HA injizieren.

NCTF® 135 und NCTF® 135HA können auch mit einer Mesopistole oder einem Mesoroller verwendet werden.
Daten in Bezug auf die Injektion (Patientenangaben und Produktchargennummer) müssen vom Arzt/Therapeuten aufbewahrt werden.

PROTOKOLL
Protokoll bestehend aus 5 Behandlungen, die ersten 3 in Abständen von 2 Wochen, und die letzten 2 in einem Abstand von 1 Monat, einmal pro Jahr. Zusätzliche Behandlungen können alle 3 oder 6 Monate eingenommen werden, wenn der Arzt/Therapeut dies im Hinblick auf die Hautqualität für erforderlich hält.

WARNHINWEISE
• Das Verfallsdatum auf dem Etikett prüfen.
• Nicht wiederverwenden.
• Nicht resterilisieren.
• Die Nadeln müssen nach der Verwendung in einem geeigneten Abfallbehälter für spitze Gegenstände entsorgt werden.
• Die Wiederverwendung des Produkts ist mit Risiken (z. B. Kreuzkontamination) für den Patienten verbunden.
• Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist

LAGERUNGSBEDINGUNGEN
NCTF® 135 und NCTF® 135HA zwischen 2 und 25°C (36-77°F) an einem trockenen, vor Licht und Feuchtigkeit geschützten Ort lagern. Mit Vorsicht handhaben.

NCTF® 135
Acido ialuronico
+ soluzione poli-rivitalizzante

NCTF® 135 HA
Acido ialuronico altamente concentrato
+ soluzione poli-rivitalizzante

ISTRUZIONI PER L'USO

DESCRIZIONE
5 flacone da 3ml
5 siringhe da 3ml
5 aghi da prelievo da 18G
5 agli per trattamento da 30G
5 agli per trattamento da 32G

COMPOSIZIONE

Acido ialuronico	**Conc. (mg/ml)**
NCTF® 135	
Ialuronato di sodio non reticolato	0,025
NCTF® 135HA	
Ialuronato di sodio non reticolato	5,00

Soluzione poli-rivitalizzante
12 Vitamine
Acido L-ascorbico (Vit. C)
Biotina (Vit. B8)
Acido pantotenico (Vit. B5)
Acido folico (Vit. B9)
Inositolo (Vit. I)
Nicotinammide (Vit. B3)
Piridossina (Vit. B6)
Riboflavina (Vit. B2)
Tiamina (Vit. B1)
Tocoferolo (Vit. E)
Retinolo (Vit. A)
Vitamina B12
6 Minerali
Cloruro di calcio
Cloruro di potassio
Solfato di magnesio
Acetato di sodio
Cloruro di sodio
Diidrogenofosfato di sodio
5 acidi nucleici
Desossiadenosina
Desossicitidina
Desossiguanosina
Desossitimidina
5-Metil-2'-desossicitidina
24 aminoacidi
Acido α-aminobutirrico
Alanina
Arginina
Asparagina
Acido aspartico
Cistina
Glutammina
Acido glutammico
Glicina
Istidina
Idrossiprolina
Isoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Ornitina
Fenilalanina
Prolina
Serina
Taurina
Treonina
Triptofano
Tirosina
Valina
4 coenzimi
TPP (Cocarbossilasi)
CoA (Coenzima A)
FAD (Flavina adenina dinucleotide)
NAD (Nicotinammide adenina dinucleotide)
NADP (Nicotinammide adenina dinucleotide fosfato)
UTP (Uridina trifosfato)
Altro
Glutatione
Poliuridilato 80
Acido glucuronico
Acido glucuronico lattone
Glucosammina
Destrosio anidro

INDICAZIONI
NCTF® 135: prodotto per mesoterapia anti-età avente come indicazione la bio-rivitalizzazione e l'idratazione delle pelli affaticate o che mancano di luminosità, il trattamento delle rughe superficiali.
NCTF® 135HA: prodotto per mesoterapia anti-età avente come indicazione la bio-rivitalizzazione e l'idratazione delle pelli affaticate o che mancano di luminosità, il trattamento delle rughe e la ridensificazione delle pelli mature o rilassate.
NCTF® 135 e NCTF® 135HA sono indicati per essere iniettati nell'epidermide o nel derma sulle seguenti zone:
• Viso (compresa la zona periorbitale)
• collo,
• décolleté,
• dorso delle mani,
• faccia interna delle braccia.

CONTROINDICAZIONI
Non iniettare nei vasi sanguigni.
Non deve essere usato:
• in pazienti affetti da una malattia o che presentino una qualunque alterazione cutanea sulla zona trattata.
• in pazienti che siano precedenti di malattie auto-immuni o in immunoterapia.
• in pazienti con ipersensibilità o allergia nota a uno dei componenti.
• nelle donne incinte o che allattino al seno.
• nei bambini.

PRECAUZIONI D'IMPIEGO
Esiste una mancanza di dati clinici disponibili relativamente alla tolleranza dell'iniezione di NCTF® 135 e NCTF® 135HA in una zona che è già stata trattata con un altro prodotto di riempimento dello spessore permanente. In simili casi occorre agire con precauzione, benché NCTF® 135 e NCTF® 135HA non vengano iniettati nello stesso piano.
Occorre informare i pazienti che ricevono trattamento anticoagulante o inibitore dell'aggregazione piastrinica (per esempio, acido acetilsalicilico) del maggior rischio di ematomi e di emorragia lieve sul punto di iniezione.
Il paziente deve essere informato di non truccarsi nelle 12 ore successive alla iniezione e di evitare l'esposizione prolungata al sole, ai raggi UV e alle temperature molto fredde, così come di non frequentare saune o bagni turchi per almeno 48 ore dopo l'iniezione.
Si raccomanda la formazione sulle tecniche di mesoterapia per l'uso di NCTF® 135 e NCTF® 135HA.
Non iniettare NCTF® 135 e NCTF® 135HA allo stesso momento in una zona infiammata (per esempio, dermoabrasione).
Prima dell'iniezione è possibile applicare un anestetico locale (patch o crema) nel punto dell'iniezione. Si noti che i prodotti anestetizzanti possono provocare localmente una reazione o ipersensibilità.
Non iniettare NCTF® 135 e NCTF® 135HA all'interno dei nei e in caso di lesioni cutanee tipo acne in fase attiva.

INCOMPATIBILITÀ
Esiste una incompatibilità nota tra l'acido ialuronico e i sali di ammonio quaternario, come il cloruro di benzalconio.
Di conseguenza non bisogna mai mettere NCTF® 135 e NCTF® 135HA a contatto con simili prodotti, né con materiale medico-chirurgico trattato con questo tipo di prodotti.

EFFETTI INDESIDERATI
Il medico deve informare il paziente che esistono effetti secondari potenziali legati all'uso di questo dispositivo come:
Arrossamento o lieve infiammazione locale, che scompaiono dopo 24-48 ore.
edemi lievi ed ematomi di piccole dimensioni, che scompaiono rapidamente.
sanguinamento minimo a livello del punto di iniezione, che cessa spontaneamente e rapidamente dopo l'iniezione.
dolore transitorio a livello del sito di iniezione.
Il paziente deve informare immediatamente il medico della comparsa di reazioni infiammatorie dopo una settimana dal trattamento o della comparsa di altri effetti secondari. Il medico deve quindi prendere le misure di un trattamento appropriato.
Qualsiasi altro effetto secondario indesiderato legato all'iniezione di NCTF® 135 e NCTF® 135HA deve quindi segnalato al distributore e/o al fabbricante.

MODO DI UTILIZZARE
Prima di iniziare il trattamento, il paziente deve essere informato delle indicazioni del dispositivo, delle sue controindicazioni, delle sue incompatibilità e dei suoi effetti indesiderati potenziali.
Tutte le precauzioni di igiene e asepsi devono essere adottate per preparare il sito e il paziente deve essere protetto.
1) Collegare un ago da 18G ad una siringa da 3ml (fornita nel kit) e preparare la soluzione di NCTF® 135 o NCTF® 135HA per l'iniezione.
2) Scollegare l'ago da 18G e collegare l'ago sterile adeguato per l'iniezione fornito nel kit 30G o 32G alla siringa riempita di NCTF® 135 o NCTF® 135HA.
3) Togliere il cappuccio dall'ago e iniettare NCTF® 135 o NCTF® 135HA.

NCTF® 135 e NCTF® 135HA possono essere usati anche con dispositivi per mesoterapia di tipo a pistola o roller.
I dati relativi all'

RU

NCTF 135 HA

NCTF® 135
Гиалуроновая кислота
и полирегенализирующий раствор

NCTF® 135HA
Высокомолекулярная гиалуроновая кислота
и гибкий полирегенерирующий раствор

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОПИСАНИЕ
5 ампул по 2 мл
5 ампульчиков по 3 мл
5 игл для забора с размером 18G
5 игл для инъекции с размером 30G
5 игл для процедуры с размером 32G

СОСТАВ

	Конц. (мг/мл)
Гиалуроновая кислота	
NCTF® 135	
Несодержащего гиалуронан натрия	0,025
NCTF® 135HA	
Несодержащего гиалуронан натрия	5,00
Полирегенализирующий раствор	
12 витаминов	
Аскорбиновая кислота (вит. C)	
Биотин (вит. B8)	
Пантотеновая кислота (вит. B5)	
Фолиевая кислота (вит. B9)	
Инозитол (вит. I)	
Никотинамид (вит. B3)	
Пиридоксин (вит. B6)	
Рибофлавин (вит. B2)	
Тиамин (вит. B1)	
Токоферол (вит. E)	
Ретинол (вит. A)	
Цианокобаламин (вит. B12)	
6 минералов	
Хлорид кальция	
Хлорид магния	
Сульфат магния	
Ацетат натрия	
Хлорид натрия	
Дигидрофосфат натрия	
5 нуклеиновых кислот	
Дезоксиаденозин	
Дезоксицитидин	
Дезоксигуанозин	
Дезокситимидин	
5-метил-2'-дезоксицитидин	
24 аминокислоты	
Альфа-аминокислотная кислота	
Аланин	
Аргинин	
Аспарагин	
Аспарагиновая кислота	
Цистеин	
Глутамин	
Глутаминовая кислота	
Глицин	
Гистидин	
Гидроксипролин	
Изолейцин	
Лейцин	
Лизин	
Метионин	
Орнитин	
Пролин	
Серин	
Таурин	
Треонин	
Триптофан	
Тирозин	
Валин	
6 кофакторов	
TPP (тиаминпирофосфат)	
6 коэнзимов	
TPP (бокарбоксилаза)	
CoA (Коэнзим А)	
FAD (Флавинадениндинуклеотид)	
FAD (Флавинадениндинуклеотид-адениновый)	
FAD (Гепатан флавинадениндинуклеотид)	
NAD (Никотинамидадениндинуклеотид)	
NADP (Никотинамидадениндинуклеотидфосфат)	
Другие компоненты	
Глутатион	
Полисорбат 80	
Гиалуроновая кислота	
Пластон глюкуроновой кислоты	
Пиоктанокс	
Декстроза безводная	

ПОКАЗАНИЯ
NCTF® 135: Продукт для антивозрастной мезотерапии, показанный для ревитализации и гидратации кожи с появлением тонусом или тусклой кожи, а также коррекции повышения чувствительности кожи.
NCTF® 135HA: Продукт для антивозрастной мезотерапии, показанный для интенсивной регенерации и гидратации кожи с появлением тонусом или тусклой кожи, коррекции морщин и повышения чувствительности кожи.
Процедуры NCTF® 135 и NCTF® 135HA предназначены для лечения всей поверхностной кожи, а также для лечения:
• Лица (в том числе в периорбитальной области)
• Шеи
• Зона декольте
• Тыльных поверхностей кистей
• Внутренних поверхности рук

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Не использовать при следующих состояниях:
Не использовать для следующих пациентов:
• имеющих аллергическую или какие-либо заболевания кожи в обрабатываемой области;
• имеющих аутоиммунное заболевание в анамнезе или проходящих курс иммунотерапии;
• отличающихся повышенной чувствительностью или имеющих аллергию на любой из компонентов;
• беременных или кормящих женщин;
• детей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
Отсутствуют клинические данные о попадании при введении препаратов NCTF® 135 и NCTF® 135HA в области, ранее обработанные другими «постоянными» наполнителями препаратами. В таких случаях следует применять меры предосторожности вплоть до полного удаления ранее введенного материала, если это клинически необходимо.
Пациентам, принимающим антикоагулянтные препараты или антиагрегаты: аргипаза тромбоцитов (варгатинер, аспирин) необходимо отметить о повышенном риске кровотечения в месте проведения инъекции.
Избегать воздействия прямых солнечных лучей на нанесить макияж в течение 12 часов после инъекции и избегать длительного воздействия солнца, УФ-ячей, морозов, а также не посещать сауны или горячие ванны в течение 48 часов после инъекции.
Для использования препаратов NCTF® 135 и NCTF® 135HA рекомендуется пройти обучение техникам выполнения мезотерапии.
Не вводить препараты NCTF® 135 и NCTF® 135HA одновременно с другими препаратами одного и того же объема с минимального перерыв или разведения.
Перед инъекцией можно применять средство местной анестезии (пластырь или крем). Применение обезболивающих средств может вызвать локальное покраснение или повышенную чувствительность.
Не вводить препараты NCTF® 135 и NCTF® 135HA в радиево (кожух), а также в области, пораженные острой формой акне.

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ
Выявлено несовместимость гиалуроновой кислоты и солей четырехвалентного аммониевого основания, таким как бензалкония хлорид.
Таким образом, следует не допускать взаимодействие препарата NCTF® 135 и NCTF® 135HA с иными продуктами или с медицинскими и хирургическими устройствами, обработанными ими.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Врач должен сообщить пациенту о том, что возможны нежелательные последствия, связанные с введением под кожу этого препарата. Они перечислены ниже:
Покраснение или легкая чувствительность, обычно исчезающие в течение 24–48 часов.
Отек или и небольшая гематома, исчезающие в течение 48 часов.
Небольшие кровотечения в месте инъекции, быстро и самостоятельно останавливающиеся после прекращения.
Проходящая боль в месте инъекции.
Пациент должен как можно скорее уведомить врача о каких-либо востановительных реакциях, на проходящих в течение более одной недели, или о появлении любого другого нежелательного явления. Врач должен соответствующим образом выполнить необходимые действия.
О каких-либо других нежелательных явлениях, связанных с инъекцией продукта NCTF® 135 и NCTF® 135HA необходимо сообщать дистрибьютору и/или производителю.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перед началом процедуры необходимо осмотреть пациента с показаниями к применению препарата, противопоказаниями, несовместимостью и возможными нежелательными последствиями.
Перед инъекцией необходимо подготовить место инъекции, материалы и пациента, применяя все асептические и антисептические меры предосторожности.
1. Сложить из ту размера 18G из шприцев из 3 мл (входящие в комплект) и с стерильным условием набрать раствор препарата NCTF® 135 или NCTF® 135HA (в зависимости от того, какой из них должен быть введен).
2. Отсоединить иглу размера 18G и подсоединить соответствующую стерильную иглу для инъекции, входящую в комплект 30G или 32G, в шприц, напыленному препарата NCTF® 135 или NCTF® 135HA.
3. Удалить воздух из иглы и шприца препарат NCTF® 135 или NCTF® 135 HA.
Препараты NCTF® 135 и NCTF® 135HA можно также использовать с оптоцитами для мезотерапии, таким как пистолет или роллер.
Информация об инъекции (введение с подсчете и номер партии препарата) должны храниться у врача.

ПРОТОКОЛ
Стандартный протокол включает 5 процедур. Первые три проводятся с интервалом в две недели, оставшиеся две – с интервалом в один месяц. Курс проводится один раз в год. Дополнительные процедуры можно проводить каждые три или пять месяцев, если врач посчитает это необходимым, причем по показаниям состояния кожи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
• Проверить дату истечения срока годности, нанесенную на этикетке.
• Не использовать повторно.
• Не стерилизовать повторно.
• После использования выбросить иглы в соответствующий безопасный контейнер.
• Повторное использование продукта несет риски (например, перекрестного заражения) для пациента.
• Не использовать, если упаковка была открыта или повреждена.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить препараты NCTF® 135 и NCTF® 135HA при температуре от 2 до 25°C (36–77°F) в сухом месте, защищенном от света и влаги. Обращаться с осторожностью.

PL

NCTF 135 HA

NCTF® 135
Kwas hialuronowy
i roztwór polirewitalizujący

NCTF® 135HA
Wysoko stężony kwas hialuronowy
i roztwór polirewitalizujący

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

OPIS
5 fiolek po 2ml
5 strzykawek po 3ml
5 igieł do zaciągania produktu 18G
5 igieł zabiegowych 30G
5 igieł zabiegowych 32G

SKŁAD

	Stęż. (mg/ml)
Kwas hialuronowy	
NCTF® 135	
Nieusieciowany hialuronian sodu	0,025
NCTF® 135HA	
Nieusieciowany hialuronian sodu	5,00
Roztwór polirewitalizujący	
12 witamin	
Kwas askorbinowy (wit. C)	
Biotyna (wit. B8)	
Kwas pantotenowy (wit. B5)	
Kwas foliowy (wit. B9)	
Inozytol (wit. I)	
Nikotynamid (wit. B3)	
Pirydoksyna (wit. B6)	
Ryboflawina (wit. B2)	
Tiamina (wit. B1)	
Tokoferol (wit. E)	
Retinol (wit. A)	
Witamina B12	
6 minerałów	
Chlorek wapnia	
Chlorek potasu	
Siarczan magnezu	
Octan sodu	
Chlorek sodu	
Diwodorofosforan sodu	
5 kwasów nukleinowych	
Deoksyadenozyna	
Deoksycytydyna	
Deoksyguanozyna	
Deoksytymidyna	
5-metylo-2'-deoksycytydyna	
24 aminokwasy	
Kwasy α-aminowe	
Alanina	
Arginina	
Asparagina	
Kwas asparaginowy	
Cystyna	
Glutamina	
Kwas glutaminowy	
Glicyna	
Histydyna	
Hydroksyprolina	
Izoleucyna	
Leucyna	
Lizyna	
Metionina	
Ornityna	
Fenyloalanina	
Prolina	
Seryna	
Taurina	
Treonina	
Tryptofan	
Tyrozyna	
Walina	
6 koenzymów	
TPP (tiamina)	
CoA (Koenzym A)	
FAD (Flawino-adeninowy)	
FAD (Dinukleotyd flawinowo-adeninowy)	
FAD (Fosforan dinukleotydu nikotynamido-adeninowego)	
UTP (Urydyno-5'-trifosforan)	
Inne	
Glutation	
Polisorbat 80	
Kwas glukuronowy	
Lakton kwasu glukuronowego	
Glukozamina	
Dekstroza bezwodna	

WSKAZANIA
NCTF® 135: Produkt do mezoterapii przeciw starzeniu, wskazany do cery zmęczonej, nawilżania zmęczonej lub matowej skóry oraz zwalczania zmarszczek powierzchniowych.
NCTF® 135HA: Produkt do mezoterapii przeciw starzeniu, wskazany w celu intensywnej rewitalizacji i nawilżania zmęczonej lub matowej skóry, zwalczania zmarszczek oraz poprawy gorliwości skóry dojrzałej bądź zwiotczałej.
Produkty NCTF® 135 i NCTF® 135HA są przeznaczone do wstrzykiwania do naskórka lub skóry właściwej w następujących miejscach:
• Twarz (także w okolicach oczu)
• Szyja
• Obszar dekoltu
• Dłonie i ręce
• Wewnętrzna strona ramion

PRZECIWWSKAZANIA
Nie wstrzykiwać do naczyń krwionośnych.
Nie stosować u pacjentów:
• pacjentów z jakimikolwiek zaburzeniami lub chorobami skóry w miejscu zabiegu;
• pacjentów z historią chorób autoimmunologicznych lub w trakcie immunoterapii;
• pacjentów z nadwrażliwością lub znaną alergią na którykolwiek ze składników;
• kobiet w ciąży lub karmiących piersią;
• dzieci.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące iniekcji preparatu na iniekcja produktu NCTF® 135 i NCTF® 135HA w miejscu, w którym wcześniej zostały wprowadzone inne „stałe” produkt wypełniający. W takich przypadkach należy zachować ostrożność, chociaż produkty NCTF® 135 i NCTF® 135HA nie są wstrzykiwane na tej samej głębokości.
Pacjenci leczeni przy użyciu leków przeciwzakrzepowych lub trombocytarnych (takich jak warfaryna lub kwas acetylosalicylowy) muszą zostać poinformowani o podwyższonym ryzyku wystąpienia siniaków i krwawienia w miejscu iniekcji.
Pacjent powinien zostać poinformowany, że nie należy używać makijażu przez 12 godzin po zabiegu, unikać produktu oraz unikać długotrwałego narażenia na działanie promieni słonecznych, promieniowania ultrafioletowego, mrozu, a także nie korzystać z sauny lub kąpieli gorącej przez co najmniej 48 godzin po iniekcji.
Przed użyciem produktów NCTF® 135 i NCTF® 135HA zaleca się przeprowadzenie szkolenia z technik wykonywania mezoterapii.
Nie wolno wstrzykiwać produktu NCTF® 135 i NCTF® 135HA jednocześnie z innymi produktami o tej samej objętości w tej samej strzykawce lub bez zachowania odpowiedniego odstępu czasu.
Przed iniekcją można przepisać środek miejscowo znieczulający (plaster lub krem). Może zostać zastosowane znieczulenie miejscowe, jednak może to powodować zwiększone zaczerwienienie lub nadwrażliwość.
Nie należy wstrzykiwać produktu NCTF® 135 i NCTF® 135HA do jakichkolwiek zmian skórnych (takich) oraz aktywnych zmian skórnych spowodowanych trądzikiem.

PRZYPADKI NIEZGODNOŚCI
Stwierdzono niezgodność pomiędzy kwasem hialuronowym, a czwartorzędowymi solami amonowymi, takimi jak chlorek benzalkonium.
W związku z powyższym, produkty NCTF® 135 i NCTF® 135HA nie mogą być mieszane wspólnie z innymi jakimikolwiek kwasami z wyjątkiem produktami lub sprzętem medycznym/chirurgicznym czy/oczyszczonym tymi produktami.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Lekarz musi poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia niepożądanych efektów związanych z wstrzyknięciem tego produktu, takich jak:
Zaczerwienienie lub delikatne miejscowe zapalenie, które zwykle ustępuje po upływie 24 do 48 godzin.
Obrzęk lub siniaczenie, które utrzymują się przez kilka dni, ale zwykle ustępują po upływie tygodnia.
Niezręczne krwawienie w miejscu iniekcji, które ustępuje szybko i samoistnie po zakończeniu.
Przejściowy ból w miejscu iniekcji.
Pacjenci powinien jak najszybciej poinformować lekarza o jakichkolwiek reakcjach zapalnych trwających przez ponad tydzień lub o wystąpieniu jakichkolwiek innych działań niepożądanych. Lekarz musi zastosować odpowiednie leczenie działań niepożądanych.
Jakiekolwiek działania niepożądane związane z iniekcją produktu NCTF® 135 i NCTF® 135HA muszą być zgłaszane dystrybutorowi i/lub producentowi.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Przed rozpoczęciem leczenia pacjent musi zostać poinformowany o wskazaniach, przeciwwskazaniach, niezgodności, działaniach niepożądanych.
Należy podjąć wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia aseptyki i higieny w miejscu zabiegu oraz przygotować niezbędne wyposażenie i pacjenta przed wykonaniem iniekcji.
1/ Zaciągnąć igłę 18G na strzykawkę (w zestawie) i w sposób sterylny zaciągnąć roztwór NCTF® 135 lub NCTF® 135HA, w zależności od tego, który z nich ma zostać wstrzyknięty.
2/ Zdjąć igłę 18G i założyć odpowiednią, dostarczoną w zestawie igłę do iniekcji 30G lub 32G na strzykawkę wypełnioną produktem NCTF® 135 lub NCTF® 135HA.
3/ Usunąć powietrze igłą i strzykawkę i roztwór produktu NCTF® 135 lub NCTF® 135HA.
Produkty NCTF® 135 i NCTF® 135HA można także wstrzykiwać z optocytami do mezoterapii, takimi jak pistolet lub rolka.
Informacje o wstrzyknięciu (zawierające informacje na temat pacjenta oraz numer partii produktu) muszą zostać zarchiwizowane przez lekarza.

PROTOKÓŁ
Standardowy protokół obejmuje 5 zabiegów, pierwsze 3 wykonywane w odstępie 2 tygodni, a ostatnie 2 w odstępie 1 miesiąca, raz do roku. Dodatkowe zabiegi mogą być przeprowadzone co 3 lub 6 miesięcy, jeżeli lekarz uzna to za niezbędne w zależności od stanu skóry.

OSTRZEŻENIA
• Sprawdzić ważność na etykiecie termin przydatności do użycia.
• Produkt nie jest przeznaczony do użytku wielokrotnego.
• Nie sterylizować ponownie.
• Po użyciu igły należy zostać usunięcie do odpowiedniego, bezpiecznego pojemnika.
• Ponowne użycie produktu stanowi zagrożenie (np. zakażeniem krzyżowym) dla pacjenta.
• Nie używać, jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA / MAGAZYNOWANIA
Produkty NCTF® 135 i NCTF® 135HA powinny być przechowywane w temperaturze od 2 do 25°C (36–77°F) w suchym miejscu, zabezpieczonym przed światłem i wilgocią. Podczas stosowania należy zachować ostrożność.

TR

NCTF 135 HA

NCTF® 135
Hyalüronik asit
ve çoklu cerlandırıcı solüsyon

NCTF® 135HA
Yüksek yoğunluklu hyalüronik asit
ve çoklu cerlandırıcı solüsyon

KULLANIM TALİMATLARI

AÇIKLAMA
5 x 3 ml şişe
5 x 3 ml şırınga
5 x 18G geri çekme iğnesi
5 x 30G kar iğnesi
5 x 32G kar iğnesi

SKLAD

	Konc. (mg/ml)
Hyalüronik asit konsantresi	
NCTF® 135	
Çapraz bağlı olmayan Sodyum Hyalüronat	0,025
NCTF® 135HA	
Çapraz bağlı olmayan Sodyum Hyalüronat	5,00
Çoklu canlandırıcı solüsyon	
12 vitamin	
Askorbik asit (vit. C)	
Biyotin (vit. B8)	
Pantotenik asit (vit. B5)	
Folik asit (vit. B9)	
İnositol (vit. I)	
Nikotinamid (vit. B3)	
Piridoksin (vit. B6)	
Riboflavin (vit. B2)	
Tiamin (vit. B1)	
Tokoferol (vit. E)	
Retinol (vit. A)	
Vitamin B12	
6 mineral	
Kalsiyum klorür	
Potasyum klorür	
Magnezyum sülfat	
Sodyum asetat	
Sodyum klorür	
Sodyum dihidrojen fosfat	
5 nükleik asit	
Deoksiadenozin	
Deoksisitidin	
Deoksiguanozin	
Deoksitimidin	
5-Metil- -2'-Deoksisitidin	
24 amino asit	
α-Aminoasitlerik asit	
Alanin	
Arjinin	
Asparajin	
Aspartik asit	
Sistin	
Glütamin	
Glütamik asit	
Glisin	
Histidin	
Hidroksiprolin	
İzoleusin	
Lösin	
Lizin	
Metionin	
Ornitin	
Fenilalanin	
Prolin	
Serin	
Taurin	
Treonin	
Triptofan	
Tirozin	
Valin	
6 koenzimi	
TPP (tiamin pirofosfat)	
CoA (Koenzim A)	
FAD (Flavin adenin dinükleotid)	
FAD (Dinükleotid flavin-adenindinükleotid)	
FAD (Flavinkan dinukleotidi nikotinamidi-adenindinükleotid)	
UTP (Uridyno-5'-trifosforan)	
Diğer	
Glütasyon	
Polisorbat 80	
Glukuronik asit	
Glukuronik asit lakton	
Glukozamin	
Dekstroz anhidriz	

ENDİKASYONLAR
NCTF® 135: Yaygın veya cansız cildin yeniden canlandırılması, hidratasyonu ve derin olmayan kırışıklıkların onarımı için endike mezoterapi ürünü.
NCTF® 135HA: Yorgun veya cansız cildin yoğun bir şekilde yeniden canlandırılması, hidratasyonu ve derin olmayan kırışıklıkların onarımı ve yaşlanmış ya da sarkmakta olan cildin gelişmiş sıkılaştırılması için endike mezoterapi ürünü.
NCTF® 135 ve NCTF® 135HA aşağıdaki alanlarda cilt altı ya da cilde enjekte edilmeye endikedir:
• Yüz (periorbital alan dahil)
• Boyun
• Dekolte alanı
• Ellerin sırt kısmı
• Kolların iç yüzeyi

KONTRENDİKASYONLAR
Kan damarlarına enjekte etmeyin.
Aşağıdaki hastalarda kullanmayın:
• kürün uygulanacağı alanda herhangi bir şekilde cilt bozukluğu ya da hastalığı olan hastalarda;
• Otoimmun hastalık geçmişi olan ya da immünoterapi görmekte olan hastalarda;
• Herhangi bir bileşene karşı aşırı duyarlılığı veya bilinen bir alerjisi varlığı olan hastalarda;
• hamile veya emziren kadınlarda;
• çocuklarda.

KULLANIM TEDBİRLERİ
Daha önce başka "kalıcı" dolgu ürünü ile halihazırda tedavi edilmekte olan alana NCTF® 135 ve NCTF® 135HA'nın enjeksiyonu ile ilgili olarak herhangi bir veri mevcut değildir. Bu gibi vakalarda NCTF® 135 ve NCTF® 135HA aynı cilt derinliğine enjekte edilmemesine rağmen, bu gibi durumlarda tedbir alınmalıdır.
Antikoagülan tedavisi görün veya trombosit agregasyon inhibitörü (örneğin varfarin asetalsalisilik asit) kullanan hastalar, enjeksiyon yerinde morarma ve kanama riskinde artışa karşı bilgilendirilmelidir.
Hastaya, enjeksiyonu takiben 12 saat sürmüş makyaj malzemesi kullanmaması ve enjeksiyondan sonra en az 48 saat süreyle sauna veya sıcak banyo kullanmaması, güneş ışınlarına, UV ışınlarına, soğuğa ve donma koşullarında uzun süre sürekli maruz kalmaktan kaçınması önerilmelidir.
NCTF® 135 ve NCTF® 135HA kullanım için mezoterapi tekniklerini alanında eğitim önerilir.
NCTF® 135 ve NCTF® 135HA artış veya derin cil oyma ya da dermabrazyon ile aynı anda enjekte edilmemelidir.
Gerçekleştirilmeden önce lokal anestezik topikal krem veya lidokain/prilokain gibi anestezi ürünlerinin lokal kızarıklık veya ağrı duyarlılığa neden olabileceğini unutmayın.
NCTF® 135 ya da NCTF® 135HA'yı lenfanin (nevüs) içerisine ve aktif akne lezyonlarına cilt bozukluklarına enjekte etmeyin.

UYUMSUZLUKLAR
Hyalüronik asit ile benzalkonium klorid gibi kuaternar amonyum katyon sağlayan tuzlarda bileşimi bir uyumsuzluk vardır.
NCTF® 135 ve NCTF® 135HA, bu nedenle söz konusu ürünlerle veya bu ürünlerle işlenmiş tıbbi veya cerrahi aletlerle karıştırılmamalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER
Hekim bu cihazın implantasyonu ile bağlantılı aşağıdaki olası istenmeyen etkilerden hastayı bilgilendirmelidir:
Genellikle 24 ile 48 saat içerisinde kaybolan kızarıklık veya hafif lokal ödem.
Hafif ödem ve küçük kan toplağı meydana gelebilir; ancak 48 saat içerisinde kaybolur.
Enjeksiyon sonrasında, enjeksiyon yerinde hızlı ve kendiliğinden duran az miktarda kanama.
Enjeksiyon yerinde kısa süreli ağrı.
Hasta, bir haftadan fazla süren ilitoplı reaksiyon ya da başka türlü yan etkinin görülmesi durumunda hekime mümkün olduğunca kısa sürede bilgi vermelidir. Hekim uygun tedaviyi yan etkiyi tedavi etmelidir.
NCTF® 135 ve NCTF® 135HA'nın enjeksiyonu ile bağlantılı başka her türlü yan etki dağıtıcıya ve/veya üreticiye rapor edilmelidir.

KULLANIM TALİMATLARI
Tedaviye başlanmadan önce, hasta cihazın endikasyonları, kontrendikasyonları, uyumsuzlukları ve olası istenmeyen etkileri hakkında bilgilendirilmelidir.
Enjeksiyonun düzgün yapılabilmesi için gerekli tüm önlemler alınmalı ve hasta, enjeksiyon için gerekli ekipmanlar ve enjeksiyon bölgesi hazırlanmalıdır.
1/ 18G iğneyi bir 3 ml şırıngaya (kitte verilen) takın ve enjekte edilecek NCTF® 135 ya da NCTF® 135HA solüsyonunu aseptik olarak çekin.
2/ 18G iğneyi çıkarın ve enjeksiyon için kitte verilen uygun steril iğneyi (30G veya 32 G) NCTF® 135 ya da NCTF® 135HA ile doldurulan şırıngaya takın.
3/ Şırıngadan ve iğneden hava çıkarın ve NCTF® 135 ya da NCTF® 135HA'yı aseptik olarak enjekte edin.
NCTF® 135 ve NCTF® 135HA'yı ayrıca tabanca ya da roller gibi mezoterapi cihazları ile kullanabilirsiniz.
Enjeksiyon ile ilgili veriler (hasta ayrıntıları ve ürün parti numarası) hekim tarafından muhafaza edilmelidir.

PROTOKOL
5 kürden oluşan standart protokol, ilk üçü 2 hafta arayla ve son ikisi 1 ay arayla olmak üzere, yılda bir kez. Ek kürler, hekim cilt kalitesi açısından gerekli görüyorsa her 3 veya 6 ayda verilebilir.

UYARILAR
• Etiketteki son kullanma tarihini kontrol edin.
• Yeniden kullanmayın.
• Yeniden sterilize etmeyin.
• Iğneler kullanıldıktan sonra uygun güvenli bir kap içerisine yerleştirilmelidir.
• Ürünün yeniden kullanımı hasta için riskler (örneğin çapraz kontaminasyon) içerir.
• Ambalajı açık veya hasarlıysa kullanmayın

SAKLAMA / MUHAFAZA KOŞULLARI
NCTF® 135 ve NCTF® 135 HA'yı; ışık ve nemden korumalı kuru bir yerde 2 ila 25°C (36–77°F) arasındaki sıcaklıklarda saklayın. Dikkatli bir şekilde tutun.

CS

NCTF 135 HA

NCTF® 135
Kyselina hyaluronová
a polyregenerační roztok

NCTF® 135HA
Vysoce koncentrovaná kyselina hyaluronová
a polyregenerační roztok

NÁVOD K POUŽITÍ

POPIS
5 x lahvička 3 ml
5 x stříkačka 3 ml
5 x nástrčková jehla 18G
5 x aplikační jehla 30G
5 x aplikační jehla 32G

SLOŽENÍ

	Koncentr.(mg/ml)
Kyselina hyaluronová	
NCTF® 135	
Nesosítěný hyaluronát sodný	0,025
NCTF® 135HA	
Nesosítěný hyaluronát sodný	5,00
Polyregenerační roztok	
12 vitaminů	
Kyselina askorbová (vit. C)	
Biotin (vit. B8)	
Kyselina pantothenová (vit. B5)	
Kyselina listová (vit. B9)	
Inositol (vit. I)	
Nikotinamid (vit. B3)	
Pyridoxin (vit. B6)	
Riboflavin (vit. B2)	
Thiamin (vit. B1)	
Tokoferol (vit. E)	
Retinol (vit. A)	
Vitamin B12	
6 minerálů	
Chlorid vápenatý	
Chlorid draselný	
Síran hořečnatý	
Octan sodný	
Chlorid sodný	
Dihydrogenfosforečnan sodný	
5 nukleových kyselin	
Deoxyadenosin	
Deoxycytidin	
Deoxyguanosin	
Deoxythymidin	
5-methyl-2'-deoxycytidin	
24 aminokyselin	
Kyselina alfa-aminoamidová	
Alanin	
Arginin	
Asparagin	
Kyselina aspartová	
Cystin	
Glutamin	
Kyselina glutamová	
Glycin	
Histidin	
Hydroxyprolin	
Isoleucin	
Leucin	
Lysin	
Methionin	
Ornitin	
Fenylalanin	
Prolin	
Serin	
Taurin	
Threonin	
Tryptofan	
Tyrosin	
Valin	
6 koenzymů	
TPP (thiaminpyrofosfát)	
CoA (koenzym A)	
FAD (flavinadenindinukleotid)	
FAD (flavinadenindinukleotid-adenin)	
FAD (hlubokomrazicí flavinadenindinukleotid)	
NADP (flavinadenindinukleotidfosfát)	
UTP (uridin-5'-trifosfát)	
Jiné	
Glutathion	
Polysorbát 80	
Kyselina glukuronová	
Lakton kyseliny glukuronové	
Glukosamin	
Bezvodá dextróza	

INDIKACE
NCTF® 135: Mezoterapeutický produkt proti stárnutí určený pro biorevitalizaci a hydratační únavené nebo mdlé pokožky a pro vyplnění povrchových vrásek.
NCTF® 135HA: Mezoterapeutický produkt proti stárnutí určený pro intenzivní regeneraci a intenzivní hydratační únavené nebo mdlé pokožky a pro vyplnění vrásek a obnovení hustoty zralé nebo povadlé pleti.
Produkty NCTF® 135 a NCTF® 135HA jsou určeny k injekční aplikaci do epidermis nebo dermis v těchto oblastech:
• Celý obličej (včetně periorbitální oblasti)
• Krk
• Dekolt
• Ohbí rukou
• Hřbety rukou
• Vnitřní strana paží

KONTRAINDIKACE
Nevstřikovat do krevních cév.
Produkt nesmí být použit u:
• pacientů s jakýmikoli poškozeními kůže v ošetřované oblasti;
• pacientů s chorobami autoimunitního onemocnění nebo u pacientů podstupujících imunoterapii;
• pacientů, u nichž je známa přecitlivělost nebo alergie na některou z těchto složek;
• těhotných a kojících žen;
• dětí.

OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ
• K dispozici nejsou klinické údaje o snášenlivosti injekce produktů NCTF® 135 a NCTF® 135HA do oblastí, které byly již v minulosti ošetřeny jinou tzv. trvalou dermální výplní. V takovém případě je třeba dodržet opatrnost, přestože se produkty neaplikují do stejné hloubky.
• Informuje pacienty užívající antikoagulační přípravky nebo inhibitor agregace krevních destiček (např. aspirin) o zvýšeném riziku vzniku modřin a krvácení v místě vpichu.
Upozorněte pacienty, že si nesmí nanášet na pokožku make-up po dobu nejméně 12 hodin po aplikaci injekce a že se po dobu minimálně 48 hodin po ošetření nesmí dělat dobu vystavené slunečnímu záření, ultrafialovému záření a mrazu a také by neměl navštěvovat saunu nebo turecké lázně.
Před použitím produktů NCTF® 135 a NCTF® 135HA se doporučuje podstoupit v technikách mezoterapie.
Produkty NCTF® 135 a NCTF® 135HA se nesmí aplikovat současně s jinými produkty stejného objemu ve stejné stříkačce.
Před podáním injekce lze provést lokální anestezii (náplast nebo krém). Anestezie může způsobit místní zarudnutí nebo zvýšenou citlivost.
Nevstřikujte NCTF® 135 a NCTF® 135HA do cévy, ani do kožních lézí.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Lékař musí informovat pacienta o možných nežádoucích účincích souvisejících s aplikovaným tohoto produktu:
Zarudnutí nebo mírné lokální zánětlivé, které do 24 nebo 48 hodin zmizí.
Otoky se vyskytnout mírné edémy a malé hematomy, které do 48 hodin zmizí.
Nepříjemné krvácení v místě vpichu, které se po aplikování injekce samovolně a rychle zastaví.
Přechodná bolest v místě vpichu.
Pokud zánětlivé reakce trvají déle než týden nebo se vyskytnou jakékoliv jiné nežádoucí účinky, měl by pacient co nejdříve informovat svého praktického lékaře. Lékař pak musí vhodnou léčbu.
Jakýkoli jiný nežádoucí účinek související s injekcí aplikovaným produktů NCTF® 135 a NCTF® 135HA je nutné oznámit prodejci a/ nebo výrobci.

NÁVOD K POUŽITÍ
Před ošetřením je nutná pacienta informovat o indikacích přípravku, o jeho kontraindikacích, nekompatibilitách a o případných nežádoucích účincích.
Před aplikováním injekce je nutné učinit veškerá hygienická a aseptická opatření týkající se přípravy ošetřovaného místa, samotné a pacienta.
1/ Připojte jehlu 18G ke stříkačce 3 ml (jsou součástí sady) a asepticky naberte roztok produktů NCTF® 135 nebo NCTF® 135HA podle toho, který z nich chcete použít.
2/ Jehlu 18G odpojte a ke stříkačce naplněné přípravkem NCTF® 135 nebo NCTF® 135HA připojte sterilní jehlu vhodnou pro aplikování injekce dodanou v sadě (300 nebo 32G).
3/ Stříkačkou z jehly vytlačte vzduch a aplikujte injekci s přípravkem NCTF® 135 nebo NCTF® 135HA.
Přípravky NCTF® 135 a NCTF® 135HA lze rovněž aplikovat pomocí mezinárodní pro mezoterapii typu pistole nebo válečku. Lékař musí uchovávat záznamy o aplikovaných injekce (kontaktní údaje pacienta a číslo šarže produktu).

PROTOKOL OŠETŘENÍ
Standardní protokol 5 ošetření: první 3 ošetření v 2týdenních intervalech a 2 poslední ošetření v měsíčních intervalech, jednou ročně. Další ošetření lze provést každé 3 nebo 6 měsíců, pokud to lékař s ohledem na kvalitu pokožky sám za nezbytné.

UPOZORNĚNÍ
• Zkontrolujte datum použitelnosti uvedená na štítku.
• Nepoužívejte opakovaně.
• Znovu nesterilizujte.
• Použité jehly vyhoďte do příslušného bezpečného kontejneru.
• Opětovné použití produktu skrývá pro pacienta riziko (například křížové kontaminace).
• Pokud je obal poškozený, je v otevřený nepoužívejte.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ/UCHOVÁVÁNÍ
Přípravky NCTF® 135 a NCTF® 135HA uchovávejte při teplotě 2 až 25 °C (36–77 °F) na suchém místě a chraňte před světlem a vlhkostí. Zacházejte s nimi opatrně.

ZH

NCTF 135 HA

NCTF® 135
透明质酸
+聚再生溶液

NCTF® 135HA
高浓缩透明质酸
+聚再生溶液

使用说明

描述
5 x 3ml 小瓶
5 x 3ml 注射器
5 x 18G 抽吸针
5 x 30G 输注针
5 x 32G 输注针

成分

	浓度(mg/ml)
浓缩透明质酸	
NCTF® 135	
未交联透明质酸钠	0.025
NCTF® 135HA	
未交联透明质酸钠	5.00
维体活化液	
12 种维生素	
抗坏血酸 (维生素 C)	
生物素 (维生素 B8)	
泛酸 (维生素 B5)	
叶酸 (维生素 B9)	
肌醇 (维生素 I)	
烟酰胺 (维生素 B3)	
吡哆