

Graphics&Packing Technology Section ICN POLFA RZESZÓW S.A.		ULOTKA PIL		BAUSCH + LOMB	
Nazwa produktu Product Name	Minims Phenylephrine Hydrochloride 2,5 % and 10 %W/W DRP 20 Sterile 0,5 ml single dose units		Kolor nadruku Colours		
			Black		
Kraj Country (ISO)	SA, UAE, KW & JO		Nr wyrojnika Spec No	5338 revision F	
Opracowane przez Designed by	Lukasz Kozioł lukasz.kozioł@valeant.com Phone: +48 17 865 5537		Kod Wytwórcy Manufacturer code	77092	
Nr korekty Proof No	10	Data Date	30-03-2022	Kod farmaceutyczny Pharmacode	-
Kod wersji Valeant version code	P9SA02		Inny kod Other code	77092 (Data Matrix)	
Rozmiar czcionki Font size	minimum 6 pt		Wymiar ulotki PIL size	160 x 240 mm	
Krój czcionki Font used	Frutiger Neue LT W1G Condensed Frutiger Neue LT W1G Condensed Bold		Gramatura papieru Paper weight	60 g/m²	
Komentarze Comments (Reason for the change)					
Regulatory change for safety update PMR_ICN-19-0047-A Packing Site: Laboratoire Chauvin - Nathalie CLOT, nathalie.clot@bausch.com proof 6 prepared by Monika Rogoża					
Akceptacja Techniczna Technical Approval					
Akceptacja Działu ds. Rejestracji Regulatory Affairs Dept. Approval					

Art. 77092 P9SA02

**BAUSCH + LOMB**

Package leaflet: Information for the user

Minims® Phenylephrine Hydrochloride 2.5% w/v Minims® Phenylephrine Hydrochloride 10% w/v Eye Drops, solution Phenylephrine Hydrochloride

Read all this leaflet carefully before you start using this medicine because it contains important information for you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your doctor.
- If you get any side effects, talk to your doctor. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

In this leaflet:

- What Minims® Phenylephrine Hydrochloride eye drops are and what they are used for
- What you need to know before you use Minims® Phenylephrine Hydrochloride eye drops
- How to use Minims® Phenylephrine Hydrochloride eye drops
- Possible side effects
- How to store Minims® Phenylephrine Hydrochloride eye drops
- Content of the pack and other information

1. What Minims® Phenylephrine Hydrochloride eye drops are and what they are used for
Minims® Phenylephrine Hydrochloride contains a mydriatic agent. It is used to enlarge the pupil of your eye. Your doctor or eye specialist may use it to examine your eye more closely or as part of a treatment program.

Minims® Phenylephrine Hydrochloride 2.5% is indicated for children, adults and the elderly. Minims® Phenylephrine Hydrochloride 10% is not indicated for children or the elderly, as this concentration is too strong. The doctor or eye specialist will use an alternative medicine in these patients.

2. What you need to know before you use Minims® Phenylephrine Hydrochloride eye drops

Do not use Minims® Phenylephrine Hydrochloride drops if:

- you are allergic to the active substance (phenylephrine) or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6)
- you have a heart disease
- you have fast heartbeats (tachycardia)
- you have high blood pressure
- you have bulges in major blood vessels (aneurysms)
- you have an overactive thyroid gland (hyperthyroidism)
- you have high blood sugar level (diabetes mellitus)
- Patients on monoamine oxidase inhibitor, tricyclic antidepressant and anti-hypertensive agents (including beta-blockers)

- Patients with closed angle glaucoma (unless previously treated with iridectomy) and patients with a narrow angle prone to glaucoma precipitated by mydriatics.
- Use in patients wearing contact lenses
- Do not use Minims® Phenylephrine Hydrochloride 10% in children below the age of 12 years.

Warning and precautions

Use with caution in the elderly. Minims® Phenylephrine Hydrochloride 10% should not be used in children below the age of 12 years as children appear more sensitive to the risk of serious side effects.

Minims® Phenylephrine Hydrochloride 10% is not recommended to be used in children aged 12 to 18 years as adequate clinical experience is missing.

Ask yourself the following questions

- Do you have narrow arteries in the head (cerebral arteriosclerosis)?
- Do you have asthma?
- Do your eyes develop increased internal pressure when the pupil is enlarged? The doctor or eye specialist will have checked to make sure that this problem will not affect you.
- Are your eyes red or inflamed?

If the answer to any of these questions is yes, tell your doctor or eye specialist.

The active substance can cause the cornea to become cloudy if the surface of the cornea is damaged. The cornea is the transparent membrane covering the surface of the eye. Your doctor or eye specialist will take this into account before deciding to give you these eye drops.

Other medicines and Minims® Phenylephrine Hydrochloride

Tell your doctor or eye specialist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines.

- medicines for depression
 - any medicines to reduce your blood pressure (including medicines called beta blockers)
 - medicines to treat irregular heartbeats (quinidine or medicines called cardiac glycosides)
- The active substance can react with several types of anesthetic (e.g. halothane). Your doctor will know about this. If you are having an operation your doctor will make sure that this problem does not affect you.

Pregnancy, breast-feeding and fertility

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or eye specialist for advice before taking this medicine as he/she may decide to use these drops or to prescribe you an alternative.

Contact lenses

Your doctor will ask you to remove your contact lenses prior to the administration of the drops. There is no information on the effect of this product on contact lenses. Therefore, do not wear your contact lenses until the effects of the drops have completely worn off.

Driving and using machines

Some people find bright light (such as daylight) uncomfortable for a few hours after receiving Minims® Phenylephrine Hydrochloride.

This may make it difficult for you to drive.

As with all eye drops, your vision may be blurred after putting the drops in. Wait until your vision is clear before driving or using machines.

3. How to use Minims® Phenylephrine Hydrochloride eye drops

Sometimes a drop of local anesthetic may be used prior to Minims® Phenylephrine Hydrochloride to prevent the stinging effect of phenylephrine eye drops.

The drops are for single use only and provided in single use "Minims" units, to treat both eyes if both eyes are affected. Once opened, use immediately. Discard any unused portion.


Dosage

The recommended dose is one drop in each eye. If necessary this can be repeated once only at least one hour after the first drop.

Phenylephrine 2.5% w/v: For examination of the eye, the normal dose for adults, elderly and children, is one drop in each eye. If necessary this can be repeated once only at least one hour after the first drop.

Phenylephrine 10% w/v should not be used in children below the age of 12 years. Minims

Phenylephrine 10% w/v is not recommended for use in children aged 12 to 18 years or elderly patients. If you are receiving this product as part of a treatment programme your doctor may suggest an additional dose schedule of one drop every 24 hours of the 2.5% w/v product.

**Method of administration**

Parents must be careful not to get this preparation in their children's mouth or cheeks and to wash their hands and the child's hands or cheeks following administration.

The doctor or eye specialist will normally put the drops in your eye for you, but if you are putting the eye drops in yourself, then follow these instructions carefully:

- Wash your hands.
- Use a mirror, this will help you to see what you are doing.
- Carefully dry your eyes using a tissue, Twist and Pull cap to separate from Minims body (Diagram 1).
- Pull your lower eyelid down gently, and then carefully place 1 drop inside your lower eyelid.
- Close your eye and blink a few times to make sure your eye is covered by the liquid.
- Close the eyelids. It is advisable to press gently on the inner corner of your eyelid for 3 minutes. This will help stop the solution draining into your nose and throat.
- Repeat steps 4, 5 and 6 for the other eye if necessary, then throw away the Minims unit, even if some solution remains.

If you use more Minims® Phenylephrine Hydrochloride than you should, an overdose is very unlikely to occur. If you suddenly feel unwell after receiving the drops, tell your doctor or eye specialist or contact your nearest emergency department immediately.

If you forget to use Minims® Phenylephrine Hydrochloride, you should take the missed dose as soon as you remember, unless it is nearly time for the next dose, but you should not take a double dose to make up for a missed dose.

4. Possible side effects

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Minims® Phenylephrine Hydrochloride may sting when the drops are first put in and your vision may become blurred. This will gradually wear off.

Serious side effects

Rarely, more serious reactions, including spasm of the artery of the heart, heart irregularities and heart attacks, have been reported after using phenylephrine solutions. These have usually occurred in patients using some 10% phenylephrine and already suffering from heart disease.

Other side effects

- Not known: frequency cannot be estimated from the available data.
- In some cases bright light can be uncomfortable for a few hours after receiving the drops.
- Occasional allergic reactions or conjunctival sensitivity (abnormal sensitivity of the conjunctiva (thin, clear, moist membrane that coats the white outer surface of the eye) to various substances with discomfort upon instillation) can occur.
- The active substance can sometimes affect your circulatory system, causing increased blood pressure and palpitations (a sensation in which a person is aware of an irregular, hard, or rapid heartbeat), tachycardia (fast heartbeats) and other heart irregularities (extrasystoles and cardiac arrhythmias).
- Paleness around the eyes in preborn babies (this is relevant to the 2.5% formulation).

Additional side effects in children:

- Not known: frequency cannot be estimated from the available data
- Fluid or swelling in the lungs (this is relevant to the 10% formulation).

Reporting of side effects

If you or your child get any side effects, talk to your doctor, the doctor treating your child or pharmacist. This includes any side effects not listed in this leaflet.

5. How to store your eye drops

Keep this medicine out of the sight & reach of children. Do not use the eye drops after the expiry date which is stated on the overwrap of each unit and on the carton after the letters "EXP". The expiry date refers to the last day of that month. Do not store above 25°C. Do not freeze. Store in the original package in order to protect from light. The drops are for single use only and provided in single use "Minims" units, to treat both eyes if both eyes are affected. Once opened, use immediately. Discard any unused portion.

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required. These measures will help to protect the environment.

6. Contents of the pack and other information**What do your eye drops contain**

- The active ingredient is phenylephrine hydrochloride. Each Minims unit contains approximately 0.5 ml eye drops solution of Phenylephrine hydrochloride 2.5% w/v (12.5 mg) or 10% w/v (50 mg).
- Not all strengths may be marketed.
- The other ingredients are sodium metabisulphite (E223), disodium edetate and purified water. This medicine does not contain a preservative as it is a sterile single use unit.

Contents of the pack

Each carton contains 20 units.

Marketing Authorisation Holder:

Bausch & Lomb UK Ltd. - 106 London Road - Kingston-upon-Thames - KT2 6TN - UK
Tel: +44 (0)20 8781 2900 / Fax: +44 (0)20 8781 2901

Manufacturer:

Laboratoire Chauvin - Z.I.Ripotier - 07200 Aubenas - France

To report any side effect(s)**• Saudi Arabia****National Pharmacovigilance center**

SFDA call Center: 19999

E-mail: npc.drug@sfd.gov.sa, Website: www.sfd.gov.sa/npc

• United Arab of Emirates:

Tel: 80011111, E-mail: pv@mohap.gov.ae, P.O.box: 1853 Dubai

• Other countries:

Please contact the relevant competent authority.

Council of Arab Health Ministers

This is a medicament

- Medicament is a product which affects your health and its consumption contrary to instructions is dangerous for you.
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament.
- The doctor and the pharmacist are the experts in medicines, their benefits and risks.
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you.
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor.
- Keep all medicaments out of reach of children.

DATE OF PREPARATION: April 2021

Minims is a trademark of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.

© Bausch & Lomb Incorporated.

بوش أند لومب BAUSCH+LOMB

نشرة العبوة: معلومات خاصة بالاستعمال

مينيمز® فينيلفرين هيدروكلوريد ٢,٥٪ الوزن/الحجم مينيمز® فينيلفرين هيدروكلوريد ١,٠٪ الوزن/الحجم

نقط للعين، محلول
فينيلفرين هيدروكلوريد

اقرأ كامل هذه النشرة بعناية قبل البدء في استخدام الدواء لأنه يحتوي على المعلومات الهامة بالنسبة لك.

- احفظ هذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، استشر طبيبك.
- إذا حدثت لك أي آثار جانبية، تحدث مع طبيبك. وهذا يشمل أي آثار جانبية محتملة ليست مدرجة في هذه النشرة. انظر إلى القسم ٤.

في هذه النشرة:

- ما هي نقط العين: مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد ولم تستعمل
- ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام قطرة العين مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد
- كيفية استخدام مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد قطرات العين
- آثار جانبية ممكنة
- كيف يتعين حفظ نقط العين مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد
- محتويات العبوة ومزيد من المعلومات

١. ما هي نقط العين مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد ولم تستعمل

تحتوي مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد على عامل موسع. إنه يستعمل لتوسيع بؤبؤ العين. يمكن أن يستعمله طبيبك أو أخصائي العين لكي يفحص عينك بصورة مقربة أكثر أو كجزء من برنامج علاج. يستخدم مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد ٢,٥٪ للأطفال، للبالغين وكبار السن. لا يستخدم مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد ١,٠٪ للأطفال أو كبار السن لأن هذا التركيز قوي جدًا. سوف يستعمل الطبيب أو أخصائي العين دواءً بديلاً لدى هؤلاء المرضى.

٢. ما تحتاج إلى معرفته قبل استخدام قطرة العين مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد

- لا تستعمل** نقط العين مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد قطرات في حال كنت أنت حساساً للمادة الفعالة (فينيلفرين) أو أي من المواد الأخرى (راجع قسم رقم ٦ من هذه النشرة)
- تعاني من مرض قلب
- تعاني من ضربات قلب سريعة (تسارع ضربات القلب)
- تعاني من ضغط دم عالي
- تعاني من ارتفاعات في أوعية دموية رئيسية (تعدد الأوعية)
- لديك فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الدرقية)
- تعاني من حساسية سكر عالي في الدم (مرض السكري)
- المرضى الذين يتعاطون منبهات أو كسيدات موموباين، والأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات، والأدوية الخاصة للضغط (بما في ذلك حاصرات بيتا)
- المرضى الذين يعانون من زرق صفيق الزاوية (إلا إذا سبق العلاج الجراحي للزرقية) والمرضى الذين يعانون من الزاوية الضيقة المكبوتة للزرق من قبل موسعات الحدقة.
- المرضى الذين يرتدون العدسات اللاصقة
- لا تستخدم مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد ١,٠٪ للأطفال أقل من ١٢ سنة في العمر.

تحذير واحتياطات

- لا يجب أن تستخدم مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد ١,٠٪ للأطفال أقل من ١٢ عام حيث تبين أن الأطفال أكثر حساسية للأصابة بأعراض جانبية خطيرة.
- لا ينصح باستخدام مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد ١,٠٪ للأطفال من عمر ١٢ إلى ١٨ عام لعدم توفر تجارب سريرية كافية.
- سيستخدم بحذر مع كبار السن
- إسأل نفسك الأسئلة التالية
- هل تعاني من شرايين ضيقة في الرأس (تصلب الشرايين الدماغية)؟
- هل تعاني من ربو؟
- هل يزيد ضغط العين الداخلي لديك عندما يتم توسيع البؤبؤ؟ سيكون الطبيب أو أخصائي العين قد فحص للتأكد أن هذه المشكلة لن تؤثر عليك.
- هل هناك حمراوينين أو ملتهبين؟
- إذا كان الجواب على أي من هذه الأسئلة نعم، أخبر طبيبك أو أخصائي العين الخاص بك. يمكن أن تسبب المادة الفعالة في أن تصبح القرنية عاتمة إذا كان سطح القرنية متضرر. القرنية هي غشاء شفاف يغطي سطح العين. سوف يأخذ طبيبك أو أخصائي العين ذلك بالحسبان قبل أن يقرر إعطائك نقط العين هذه.

مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد والأدوية الأخرى

- أخبر أخصائي العين أو الطبيب الخاص بك إذا كنت تتناول، أو قد تناولت مؤخرًا أو ستتناول أي أدوية أخرى.
- أدوية للاكتئاب
- أي أدوية لتقليل ضغط دمك (بما في ذلك أدوية تُسمى حاصرات بيتا)
- أدوية لعلاج النضات الغير منتظمة للقلب (الكينيدين أو أدوية تسمى جليكوسيدات القلب)
- يمكن أن تتفاعل المادة الفعالة مع عدة أنواع من مواد التخدير (مثل الهالوثين). سوف يعرف طبيبك ذلك. إذا كنت تجري عملية فسيوف يتأكد طبيبك من أن هذه المشكلة لا تؤثر عليك.

الحمل والرضاعة الطبيعية والخصوبة
إذا كنت من الحوامل أو المرضعات، تتعدي أنك قد تكوني حاملًا، أو تخططي لإجاب طفلك، أسألي أخصائي العين أو الطبيب الخاص بك للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء لأنه قد يقرر استخدام هذه القطرات أو يصف لك دواءً.

عدسات لاصقة

سوف يطلب منك طبيبك أن تُزيل عدساتك اللاصقة قبل إعطاء النقط. لا توجد هناك أية معلومات حول تأثير المنتج على العدسات اللاصقة. لذلك، لا ترتدي عدساتك اللاصقة حتى يزيلوا تأثير النقط كليًا.

القيادة واستعمال الماكينات

يجد بعض الناس أن الضوء الساطع (مثل ضوء النهار) هو غير مريح لبضعة ساعات بعد الحصول على مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد.
قد يجعل ذلك من الصعب عليك أن تقود مركبة.
كما مع جميع نقط العين، يمكن أن تتشوش رؤيتك بعد وضع النقط فيها. انتظر حتى تتضح رؤيتك قبل القيادة أو استعمال الماكينات.

٣. كيفية استخدام مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد قطرات العين

أحيانًا يمكن أن يتم استعمال نقطة من مخدر موضعي قبل مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد لمنع الإحساس بالوخز لنقط العين فينيلفرين.
النقط موجودة في وحدات "مينيمز" خاصة لاستعمال مرة واحدة، لمعالجة كلتا العينين إذا كانت كلتا العينين مصابتين. حالما تفتح، قم باستعمالها فورًا.
تخلص من أي كمية متبقية.

الجرعة
الجرعة الموصى بها هي قطرة واحدة في كل عين. إذا لزم الأمر يمكن تكرار ذلك مرة واحدة فقط بعد ساعة واحدة على الأقل من الجرعة الأولى.
فينيلفرين ٢,٥٪ وزن/حجم: لفحص العين، الجرعة العادية للبالغين وكبار السن والأطفال، هي قطرة واحدة في كل عين. إذا لزم الأمر يمكن تكرار ذلك مرة واحدة فقط بعد ساعة واحدة على الأقل من الجرعة الأولى.
لا ينبغي أن يستخدم فينيلفرين ١,٠٪ الوزن/الحجم مع الأطفال دون سن ١٢ عام. لا ينصح باستخدام فينيلفرين ١,٠٪ الوزن/الحجم في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ و ١٥ عام أو المرضى المسنين. إذا كنت تتلقى هذا الدواء كجزء من برنامج علاجي قد يفتح طبيبك جرعة إضافية كقطرة واحدة كل 24 ساعة من الدواء بتركيز ٢,٥٪ الوزن/الحجم.

Art. 77092 P9SA02

طريقة الاستخدام

- على الوالدين أن يكونوا حذرين من عدم وصول هذا الدواء إلى فم أو خدي أطفالهم وغسل اليدين وابتدي الطفل أو الخدين بعد الاستخدام.
- سوف يمنع لك عادة الطبيب أو أخصائي العين النقط في عينك، ولكن إذا كنت تمنع نقط العين بنفسك، فقم عندها باتباع هذه التعليمات بحذر:
 - اغسل يديك.
 - استعمل مرآة، سوف يساعدك ذلك على رؤية ماذا تفعل.
 - قم بحذر بتخفيف عينيك باستعمال منديل ورقي، وانزع الغطاء من جسم مينيمز للوحدة (رسم 1).
 - اسحب جنتك السفلى نحو الأسفل بلطف، وبعد ذلك ضع نقطة واحدة بحذر داخل جنتك السفلى.
 - اغضض عينك وارمشها لبضعة مرات للتأكد من أن عينك مغطاة بالسائل.
 - اغلق الجفون. يوصي بأن تضغط بلطف على الزاوية الداخلية لجنتك لمدة ٣ دقائق. سوف يساعد ذلك على وقف تسرب المحلول داخل أنفك وحلقك.
 - كرر الخطوات ٤، ٥ و ٦ للعين الأخرى إذا لزم الأمر، بعد ذلك قم بإلقاء وحدة مينيمز حتى إذا بقي بعض المحلول.

إذا استعملت مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد أكثر مما ينبغي، فمن غير المحتمل جدًا أن تحدث جرعة مفرطة، إذا شعرت فحاجة أنك لست على ما يرام بعد الحصول على النقط، أخبر طبيبك أو أخصائي العين أو اتصل بأقرب قسم الطوارئ لديك فورًا.

إذا نسيت أن تستعمل مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد، ينبغي عليك أن تأخذ الجرعة المفوتة حالما تتذكر، إلا إذا كان الوقت تقريبا للجرعة التالية، ولكن لا ينبغي عليك أن تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض عن الجرعة المفوتة.

٤. آثار جانبية ممكنة

مثل جميع الأدوية، قد يتسبب هذا الدواء بحدوث آثار جانبية، على الرغم من أنها قد لا تحدث لجميع المرضى.
مينيمز فينيلفرين لا يذبل عند بلوغ عند وضع القطرات لأول مرة وقد تصبح الرؤية غير واضحة. هذا الإحساس سوف يزول تدريجيا.

آثار جانبية خطيرة

نادرا ما يتم الإبلاغ عن ردود أفعال أكثر خطورة، بما في ذلك تشنج في شريان القلب، وعدم انتظام ضربات القلب والنوبات القلبية، بعد استخدام محلول الفينيلفرين. هذه عادة ما تحدث في المرضى الذين يستخدمون بعض محاليل ١,٠٪ الفينيلفرين ويعانون بالفعل من مرض القلب.

آثار جانبية أخرى

- غير معروف: لا يمكن تقدير التكرار من البيانات المتاحة.
- في بعض الحالات، قد يكون الضوء الساطع غير مريح لبضع ساعات بعد استعمال القطرات.
- من حين لآخر يمكن حدوث تفاعلات تحسسية أو حساسية غير طبيعية (حساسية غير طبيعية) للمنتج (غشاء رقيق، شفاف، رطب يغطي السطح الخارجي للعين) إلى مواد مختلفة مع عدم الراحة عند التفتيح).
- يمكن أن تؤثر المادة الفعالة في بعض الأحيان على جهاز الدورة الدموية مسببة ارتفاع ضغط الدم وخفقان (إحساس بكون فيه الشخص مدرك لضربات قلب غير منتظمة، قاسية أو سريعة)، تسارع نبضات القلب واضطرابات أخرى للقلب (انقباض خارجي للقلب وإرشيما قلبية).
- شحوب حول العينين في الأطفال المولودين، والأدوية المضادة للاكتئاب ثلاثية الحلقات، والأدوية الخاصة للضغط (بما في ذلك حاصرات بيتا)
- المرضى الذين يعانون من زرق صفيق الزاوية (إلا إذا سبق العلاج الجراحي للزرقية) والمرضى الذين يعانون من الزاوية الضيقة المكبوتة للزرق من قبل موسعات الحدقة.
- المرضى الذين يرتدون العدسات اللاصقة
- لا تستخدم مينيمز فينيلفرين هيدروكلوريد ١,٠٪ للأطفال أقل من ١٢ سنة في العمر.

٥. كيف يتعين حفظ نقط العين الخاصة بك

احفظها بعيدا عن متناول ورفوة الأطفال.
لا تستعمل نقط العين بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على تغليفه كل وحدة وعلى العلبة بعد أحرف انتهاء الصلاحية "EXP". يشير تاريخ انتهاء الصلاحية لليوم الأخير من ذلك الشهر. لا تحفظها فوق درجة حرارة ٢٥ مئوية. لا تجمدتها. احفظها في العبوة الأصلية لحمايتها من الضوء.
النقط موجودة في وحدات "مينيمز" خاصة لاستعمال مرة واحدة، لمعالجة كلتا العينين إذا كانت كلتا العينين مصابتين. حالما تفتح، قم باستعمالها فورًا.
تخلص من أي كمية متبقية.
لا ينبغي التخلص من الأدوية عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفاية المنزلية. أسأل صيدلانيك كيف تتخلص من الأدوية التي لم تعد مطلوبة بعد. سوف تساعد هذه الإجراءات على حماية البيئة.

٦. محتويات العبوة ومزيد من المعلومات

- على ماذا تحتوي نقط العين خاصتك**
- المادة الفعالة هي فينيلفرين هيدروكلوريد. تحتوي كل وحدة مينيمز على حوالي ٠,٥ مل محلول نقط عين من فينيلفرين هيدروكلوريد ٢,٥٪ الوزن/الحجم (١٢,٥ ملغ) أو ١,٠٪ الوزن/الحجم (٥٠ ملغ).
- قد لا تكون جميع التركيزات مسوقه.
- المركبات الأخرى هي صوديوم ميثانيسولفيت (٢٢٢٤)، ديسوديوم ايدبتات ومياه منقاة.
- لا تحتوي هذا الدواء على مادة حافظة وهو وحدة للاستعمال لمرة واحدة.

محتويات العبوة

تحتوي كل عبوة على ٢٠ وحدة.

حامل ترخيص التسويق:

بوش أند لومب المملكة المتحدة
١٠٦ لندن رود - كينجستون آيون تايمز KT2 6TN - المملكة المتحدة
هاتف: ٢٩٠٠ ٨٧٨١ (٠٢٠) +٤٤ / فاكس: ٢٩٠١ ٨٧٨١ (٠٢٠) +٤٤

المصنِّع:

لابوراتوري شوفين - ز.أ.ريويتير - ٠٧٢٠٠ - أوناسا - فرنسا

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية:

المركز الوطني للتحقق الدوائي
مركز الاتصال الموحد: 19999
البريد الإلكتروني: www.sfd.a.gov.sa/npc
الموقع الإلكتروني: npc.drug@sfd.a.gov.sa

• الإمارات العربية المتحدة:

هاتف: 80011111 **البريد الإلكتروني:** pv@moh.gov.ae **صندوق البريد:** 1853 Dubai

• الدول الأخرى:

الرجاء الاتصال بالمؤسسات والهيئات الوطنية في كل دولة.

مجلس وزراء الصحة العرب

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافاً للتعليمات بعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عنها وتعليمات الصيدلي الذي صرفها لك.
- إن الطبيب والصيدلي هما الخبيران في الدواء وينقعه وضوره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الادوية في متناول ايدي الأطفال.

تاريخ الإعداد: ابريل 2021

مينيمز هو علامة تجارية لشركة بوش أند لومب إنكوربوريتد أو شركاتها التابعة

شركة بوش أند لومب إنكوربوريتد ©

